

Biposja stercza wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym przy pomocy sondy doodbytniczej USG. Pobierane jest 10 wycinków ze stercza przy pomocy igły biopsyjnej.

Zalecenia przed zabiegiem

1. Dwa dni przed zabiegiem należy zacząć przyjmowanie antybiotyku doustnie i jego kontynuację po biopsji np. **LEVOXA 0,5** 1x dziennie przez 10 dni,
2. W trakcie przyjmowania antybiotyku zalecane jest przyjmowanie probiotyku
3. W godzinach rannych w dniu wykonania biopsji należy przyjąć **czopek glicerynowy** lub wykonać lewatywę stosując np. gotowe zestawy **ENEMA**, można zjeść lekki posiłek.
4. W przypadku niskiego progu bólu i braku przeciwwskazań jak np. uczulenie, zalecana jest godzinę przed zabiegiem 1 tabl **KETONAL FORTE**.
5. Wskazane wykonanie badań u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe- morfologia, INR
6. W przypadku zażywania leków przeciwzakrzepowych jak **ASPIRYNA proszę odstawić na 5 dni** przed zabiegiem, w przypadku zażywania innych leków jak np.: **WARFIN, TIKLOPIDYNA, CLOPIDOGREL(PLAVIX)** wskazane jest ich zastąpienie na 10 dni przed zabiegiem lekiem podskórnym np. **FRAGMIN/ CLEXANE**, w przypadku gdy **niemożliwe jest zastąpienie leku** należy o tym poinformować lekarza- decyzja lekarza prowadzącego(kardiolog, kardiochirurg, chirurg naczyniowy).

Po biopsji stercza może wystąpić:

- dyskomfort w odbytnicy lub okolicy krocza
- krew w moczu, nasieniu lub stolcu może utrzymywać się przez 2-3 dni (w nasieniu do 4 tygodni)

W przypadku masywnego krwimoczu, gorączki powyżej 38,5 C należy zgłosić się niezwłocznie do urologa lub do najbliższego szpitala na Szpitalny Oddział Ratunkowy

Po zabiegu należy unikać

- nadmiernego wysiłku, ćwiczeń fizycznych na okres 2 tygodni
- palenia papierosów, spożywania alkoholu przez okres 10-14 dni